

# DEPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST\*) SANS ORDONNANCE AU LABORATOIRE GRATUIT AVANT 26 ANS

PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ET LA MUTUELLE APRES 26 ANS

## Les IST concernées par ce dépistage

**GONOCOQUE** transmis lors de rapports sexuels non protégés. Risque d'infertilité, d'infections articulaires

**CHLAMYDIA** transmis lors de rapports sexuels non protégés. Risque d'infertilité, de douleurs pelviennes

**HEPATITE B** transmise lors de contacts avec le sang, le sperme, les sécrétions vaginales. Risque d'atteinte hépatique

**SYPHILIS** transmis par contact direct avec une lésion syphilitique pendant les rapports sexuels. Risque de troubles neurologiques, cardiovasculaires et de complications congénitales

**HIV** transmis lors de contact avec le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel. Risque d'évolution vers le sida

## Pourquoi faire le dépistage des IST ?

Le dépistage précoce permet un meilleur diagnostic, une prise en charge précoce et réduit le risque de transmission

L'absence de traitement peut conduire à des complications graves : infertilité, troubles neurologiques et cardiovasculaires, risque pour l'enfant en cas d'infection pendant la grossesse

## Quels sont les prélèvements ?

- Prise de sang pour l'HEPATITE B, le HIV et la SYPHILIS
- Premier jet d'urine ou (auto)prélèvement vaginal pour les CHLAMYDIA et GONOCOQUE, éventuellement prélèvement de la gorge et de l'anus

## Quand faire le dépistage ?

- Si symptômes gynécologiques ou urinaires
- Avant d'arrêter le préservatif
- Après un rapport sexuel non protégé, même sans pénétration
- Lors d'un désir de grossesse
- En présence de facteurs de risque (Prévoir une sérologie de contrôle 3 mois après l'épisode à risque)

## Quels sont les facteurs de risque ?

- Plusieurs partenaires sexuels
- Changement récent de partenaire sexuel
- Partenaire sexuel diagnostiqué avec une IST
- IST précédemment diagnostiquée
- Relations homosexuelles entre hommes
- Victime d'un viol

## Que faire si le résultat est positif ?

En fonction de l'infection votre biologiste vous orientera vers votre médecin habituel ou vers une structure spécialisée